


COLITIS ULCEROSA

REMISSZIÓ INDUKCIÓ



COLITIS ULCEROSA POSZTER

Források

1. Wehkamp, J. et al. Inflammatory Bowel Disease: Crohn's disease and ulcerative colitis Dtsch Arztebl Int. 113:72–82. 2016.
2. Burri E. et al. Treatment algorithm for mild and moderate-to-severe ulcerative colitis: An update. Digestion DOI:10.1159/000504092; 2020.
3. Kucharzik T. et al. Ulcerative colitis – Diagnostic and therapeutic algorithms. Dtsch Arztebl Int. 117:564–74. 2020.

A COLITIS ULCEROSA GYÓGYSZERES TERÁPIÁJÁBAN ALKALMAZHATÓ HATÓANYAGOK ÉS SZOKÁSOS DÓZISAIK

Hatóanyagcsoport	Hatóanyag	Dozírálás
5-ASA	Mesalazin	2–4,8 g/nap (orális), 1–2 g/nap (rektális)
	Budezonid	0,2 mg/nap (rektális)
Kortikoszteroidok	Budezonid MMX	9 mg/nap (orális)
	Prednizolon	0,75–1 mg/ttkg/nap
	Hidrokortizon	100 mg 4x/nap (iv.)
	Metilprednizolon	125 mg/nap (iv.)
Immunszuppresszánsok	Azatioprin	2–2,5 (max. 3) mg/ttkg/nap
	Ciklosporin	2 mg/ttkg/nap (iv.)
	Takrolimusz	0,1 mg/ttkg/nap Szérumkoncentráció: 10–15 ng/ml
Biológiai gyógyszerek	Adalimumab	Szubkután 0. hét: 160 mg, 2. hét: 80 mg, 4. hét: 40 mg. Későbbiekben 2 hetente: 40 mg. Dóziseszkaláció: 40 mg/hét
	Golimumab	Infúzió 30–90 perc. 0. hét: 5 mg/ttkg, 2. hét: 5 mg/ttkg, 6. hét: 5 mg/ttkg. Későbbiekben 8 hetente: 5 mg/ttkg
	Infliximab	Infúzió 30 perc. 0. hét: 300 mg, 2. hét: 300 mg, 6. hét: 300 mg. Későbbiekben 8 hetente: 300 mg
	Vedolizumab	Infúzió 30 perc. 0. hét: 300 mg, 2. hét: 300 mg, 6. hét: 300 mg. Későbbiekben 8 hetente: 300 mg, Dóziseszkaláció: 4 hetente 300 mg
Janus-kináz inhibitor	Tofacitinib	Orális tabletta: 5 vagy 10 mg. Első 8 héten: 10 mg napi 2x. Parciális válasznál: további 8 héten át 10 mg napi 2x. Későbbiekben: 5 mg napi 2x

Táblázat forrása: Burri E. et al. Treatment algorithm for mild and moderate-to-severe ulcerative colitis: An update. Digestion DOI:10.1159/000504092; 2020.

Rövidítések: 5-ASA = 5-aminosalicilát, iv.= intravénás, MMX = multimátrix, ttkg = testtömegkilogramm