


CROHN-BETEGSÉG



A CROHN-BETEGSÉG GYÓGYSZERES TERÁPIÁJÁBAN ALKALMAZHATÓ HATÓANYAGOK ÉS SZOKÁSOS DÓZISAIK

Hatóanyagcsoport	Hatóanyag	Dozírálás
5-ASA	Meszalazin	2,4 g fölött/nap
Kortikoszteroidok	Budezonid	9 mg/nap
	Prednizolon	0,75–1 mg/ttkg/nap
Immunosuppresszánsok	Azatioprin	2–2,5 (max. 3) mg/ttkg/nap
	Metotrexát	10–25 mg/hét + 5 mg folsav
Biológiai gyógyszerek	Adalimumab	Szubkutánv 0. hét: 160 mg, 2. hét: 80 mg, 4. hét: 40 mg, Későbbiekben 2 hetente: 40 mg
	Infliximab	Infúzió 30–90 perc, 0. hét: 5 mg/ttkg, 2. hét: 5 mg/ttkg, 6. hét: 5 mg/ttkg, Későbbiekben 8 hetente: 5 mg/ttkg
	Vedolizumab	Infúzió 30 perc, 0. hét: 300 mg, 2. hét: 300 mg, 6. hét: 300 mg, Későbbiekben 8 hetente: 300 mg

Táblázat forrása: Sulz MC. et al. Treatment algorithm for Crohn's disease. Digestion DOI:10.1159/000506364; 2020.

Rövidítések: 5-ASA = 5-aminosalicilát, ttkg = testtömegkilogramm